



เทคนิคการผลิต

ปลานิลทอง

ลำไย



ขั้นตอนและวิธีการใช้

คุณภาพสูง



ระยะแตกใบอ่อน



ระยะพืชสะสมอาหาร
ก่อนลาดสาร ระยะ 1 เดือน



ระยะแทงช่อดอก
หลังลาดสาร



ระยะบำรุงดอก



ระยะติดผลอ่อน



ระยะสร้างเนื้อขยายผล



ระยะเพิ่มความหวาน
เพิ่มน้ำหนักร



ปุ๋ยอินทรีย์

อัตรา 1 - 3 กก. / ต้น



สารทำใบ

อัตรา 1 - 3 กก. / ต้น



ปุ๋ยสูตร 10-5-5

อัตรา 0.5 - 1 กก. / ต้น

(อายุ 3 - 5 ปี)

อัตรา 1 - 2 กก. / ต้น

(อายุ 5 ปีขึ้นไป)



ปุ๋ยสูตร 10-5-5

0.5 - 1 กก. / ต้น

(อายุ 3 - 5 ปี)

1 - 2 กก. / ต้น

(อายุ 5 ปีขึ้นไป)



สารหว่านทะเลเข้มข้น

20 - 40 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร

(ก่อนลาดสาร)



ปุ๋ยสูตร 9-9-9

0.5 - 1 กก. / ต้น

(อายุ 3 - 5 ปี)

1 - 2 กก. / ต้น

(อายุ 5 ปีขึ้นไป)

(หลังลาดสาร)



ปุ๋ยสูตร 7-16-16

0.5 - 1 กก. / ต้น

(อายุ 3 - 5 ปี)

1 - 2 กก. / ต้น

(อายุ 5 ปีขึ้นไป)

(ทางราก)



สารหว่านทะเลเข้มข้น

20 - 40 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร



หัวเชื้อปลานิลทอง

30 กรัม

ต่อน้ำ 200 ลิตร

(ทางใบ)



ปุ๋ยสูตร 9-9-9

0.5 - 1 กก. / ต้น

(อายุ 3 - 5 ปี)

1 - 2 กก. / ต้น

(อายุ 5 ปีขึ้นไป)

(ทางราก)



สารหว่านทะเลเข้มข้น

20 - 40 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร



หัวเชื้อปลานิลทอง

30 กรัม

ต่อน้ำ 200 ลิตร

(ทางใบ)



ปุ๋ยสูตร 9-9-9

0.5 - 1 กก. / ต้น

(อายุ 3 - 5 ปี)

1 - 2 กก. / ต้น

(อายุ 5 ปีขึ้นไป)

(ทางราก)



สารหว่านทะเลเข้มข้น

20 - 40 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร



หัวเชื้อปลานิลทอง

30 กรัม

ต่อน้ำ 200 ลิตร

(ทางใบ)



สารหว่านทะเลเข้มข้น

20 - 40 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร



หัวเชื้อปลานิลทอง

30 กรัม

ต่อน้ำ 200 ลิตร

(ทางใบ)



ปุ๋ยสูตร 7-3-10

0.5 - 1 กก. / ต้น

(อายุ 3 - 5 ปี)

1 - 2 กก. / ต้น

(อายุ 5 ปีขึ้นไป)

(ทางราก)

หวานได้ทรงพุ่มทุก ๆ 15 - 20 วัน



สารหว่านทะเลเข้มข้น

20 - 40 ซีซี

ต่อน้ำ 20 ลิตร



หัวเชื้อปลานิลทอง

30 กรัม

ต่อน้ำ 200 ลิตร

(ทางใบ)



ปุ๋ยสูตร 7-3-10

0.5 - 1 กก. / ต้น

(อายุ 3 - 5 ปี)

1 - 2 กก. / ต้น

(อายุ 5 ปีขึ้นไป)

(ทางราก)

หวานได้ทรงพุ่มทุก ๆ 15 - 20 วัน