



เทคนิคการผลิต

มันเทศ

คุณภาพสูง

ปลานิลทอง

ขั้นตอนและวิธีการใช้

1

ระยะก่อนปลูก

เร่งราก เสริมสร้างความแข็งแรงของราก



ปุ๋ยอินทรีย์
1 กระสอบ / ไร่
เตรียมดินก่อนทำการปลูก

2

ระยะบำรุงลำต้นและใบ ระยะอายุ 10 - 30 วัน

เร่งการเจริญเติบโต บำรุงลำต้นและใบ พืชเขียวทน เขียวนาน



ใช้ปุ๋ยสูตร 10-5-5 หรือ 12-4-4
อัตราการใช้ 1 กระสอบ / 1 ไร่

อัตราการใช้ 20 - 40 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร
(ผสมอาหารเพิ่มการเร่งรากและใบ)

3

ระยะเริ่มลงหัว - ขยายขนาดหัว ระยะอายุ 90 - 120 วัน

ช่วยเพิ่มผลผลิต หัวใหญ่ น้ำหนักดี เปอร์เซ็นต์แป้งสูง



ใช้ปุ๋ยสูตร 7-3-10
เปอร์เซ็นต์แป้งสูง อัตราการใช้ 1 กระสอบ / ไร่
หัวเชื้อปลานิลทอง 30 กรัม
ต่อน้ำ 100 - 200 ลิตรฉีดพ่นในระยะ 1 ของ/ไร่
ใช้ฉีดพ่นทางใบ ระยะการฉีด 7 - 15 วัน
สำหรับทะเลเข้มข้น สูตรบักมัน + สารจับใบ
อัตราการใช้ 20 - 40 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

ปุ๋ยอินทรีย์สามารถใช้ได้ทุกช่วงระยะของพืช

- * ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
- * ช่วยกักเก็บธาตุอาหารในดิน
- * ดินสามารถอุ้มน้ำได้มากขึ้น
- * แก้ปัญหาดินเสื่อม ดินตาย

