

ทำใบก่อนออกดอก

(ฟื้นต้นหลังเก็บผลผลิต)



การทำใบ

• การใส่ปุ๋ยเพื่อฟื้นต้นทำใบ

- ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปลานิลทอง หว่านตามทรงพุ่ม 3-5 กก. ต่อต้น
- ตามด้วยหว่านสารทำใบปลานิลทอง 2-5 กก. ต่อต้น
- หว่านปุ๋ยปลานิลทองสูตร 10-5-5 อัตรา 1-2 กก. ต่อต้น

ให้ทำแบบนี้ทุก 15-30 วันต่อครั้ง โดยทำใบ 2-3 รุ่นเพื่อให้แตกใบอ่อนและทำใบให้ใหญ่และหนาส่งผลต่อการออกดอก ติดลูก ลูกตกข้าวเหนียวไม่ทิ้งลูก และได้ทุเรียนทรงสวย



• การใส่ปุ๋ยน้ำทางใบ เพื่อขยายใบให้ใหญ่ให้หนา

- | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| - สารร้ายทะเลเข้มข้นปลานิลทอง เร่งใบ | 200-300 ซีซี | น้ำ
200 ลิตร |
| - หัวเชื้อปลานิลทอง อะมิโนพาวเวอร์ | 2 ชอง | |
| - สารจับใบปลานิลทอง | 100-150 ซีซี | |

จะทำให้ใบหนา ใบใหญ่ เขียวเข้ม ส่งผลให้ดอก ติดผลได้ดี

**ปุ๋ยน้ำ ช่วยลดปัญหา การทิ้งดอกและปัญหาการทิ้งลูก



สารจับใบปลานิลทอง
ทำให้อาหารอุดมย์เข้าสู่ใบได้ดี เพราะใบจะมีใบมัน (เคลือบ) ทำให้ปุ๋ยไม่กลิ้งตก และสูญเสีย การฉีดปุ๋ยน้ำนั่นเอง

ช่วงทำดอก เปิดตาดอก

• การใส่ปุ๋ยทางราก ก่อนเปิดตาดอก

ปุ๋ยปลานิลทองสูตร 9-9-9 หรือ 7-16-16 หรือ 10-10-15 อัตราการใช้ 1-3 กก./ต้น ช่วงเปิดตาดอกเตรียมให้ต้นทุเรียนออกดอก ข้าวเหนียว ไม่ทิ้งลูก

• เปิดตาดอก

- | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| - สารร้ายทะเลเข้มข้นปลานิลทอง เร่งดอก | 200-300 ซีซี | น้ำ
200 ลิตร |
| - หัวเชื้อปลานิลทอง อะมิโนพาวเวอร์ | 2 ชอง | |
| - สารจับใบปลานิลทอง | 100-150 ซีซี | |

ฉีดเพื่อเปิดตาดอก ก่อนเข้าฤดูการออกดอกหรือหลังราดสารออกนอกฤดู การฉีดทุก 5-7 วัน โดยฉีดติดต่อกัน 3-4 ครั้ง โดยฉีดตามใบและตามกิ่งหรือบริเวณที่จะออกดอก ฉีดช่วงใช้ปลา ช่วงมะเขือพวง ดอกจะสมบูรณ์ เกษรตัวผู้จะสมบูรณ์ช่วยผสมเกสรได้ดี ส่งผลต่อการติดลูก ลูกตก ข้าวเหนียวไม่ทิ้งลูก



ปุ๋ยปลานิลทองสูตร 7-16-16

ช่วยลดการหลุดร่วงของผล กระตุ้นการออกดอก สร้างตาดอก ข้าวเหนียว

ปุ๋ยปลานิลทองสูตร 10-10-15

บำรุงต้น สะสมอาหาร บำรุงดอก ขยายผลเพิ่มน้ำหนัก

ปุ๋ยปลานิลทองสูตร 9-9-9

ช่วยบำรุงผล ทำให้ดอกสมบูรณ์ ข้าวเหนียว ไม่ทิ้งลูก

สารร้ายทะเลเข้มข้นปลานิลทอง เร่งดอก

ช่วยในการออกดอก ติดผลมาก แตกตาดอกดี บำรุงดอก ข้าวเหนียว



ทุเรียนทิ้งลูก แก้ได้

ปัญหาในการทำสวนทุเรียนที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะต้องเจอก็คือ ทุเรียนผลเล็กหลุดร่วง ทรงผลบิดเบี้ยว เนื่องจากอาหารในต้นทุเรียน ไม่เพียงพอ เมื่อมีการแตกใบอ่อนในระยะติดผลเล็กสาเหตุเกิดจากการแย่งอาหารกัน หรือปัญหาฟ้าฝนไม่เป็นใจ

ฉีดพ่นหัวเชื้อปลานิลทอง อะมิโนพาวเวอร์



2 ชอง ต่อน้ำ 200 ลิตร ใช้ทุก 7 วันหลังช่วงติดดอก

ช่วยกระตุ้นการออกดอก ยืดช่อดอก ผลผสมเกสร ติดง่าย ผลตก ข้าวเหนียว ลดปัญหาลูกแตก เฝื่อนแคลเซียม-โบรอนให้พืช

